



Harvest Dental Van Alstyne  
217 E Jefferson St, Van Alstyne, TX 75495  
(903) 482-6339  
[www.harvestdentaltexas.com/](http://www.harvestdentaltexas.com/)

## PUENTE POSTOPERATORIO | DOB:

Los puentes suelen requerir un par de citas para completarse. Los dientes se preparan durante su primera cita, mientras que se colocan coronas o puentes temporales para proteger sus dientes. Estas restauraciones temporales serán justo eso, una tapa de plástico protectora para cubrir la "preparación" mientras se fabrica su restauración **personalizada**.

### Anestesia:

Es normal que sienta adormecimiento en los labios, dientes y lengua durante varias horas cuando se ha aplicado anestesia. Se sugiere no masticar hasta que el adormecimiento haya desaparecido por completo.

### Coronas Temporales:

Hay veces que las coronas/puentes temporales se caen. Por favor, llámenos cuando esto suceda, y guarde el temporal para que podamos volver a cementarlo. Tenga en cuenta que el ajuste adecuado de su restauración final depende de que su temporal permanezca en su lugar hasta la cementación final.

Si su temporal se cae, puede intentar volver a colocar la corona/puente suavemente en su lugar y ver si permanece seguro. Si es así, continúe con su cuidado postoperatorio según las indicaciones y contáctenos si vuelve a soltarse. Se puede colocar una pequeña cantidad de vaselina dentro del temporal antes de intentar volver a colocarlo para agregar una "succión" adicional que lo fije en posición.

Si el temporal no vuelve a deslizarse en su lugar correctamente, llame a nuestra oficina para programar una cita de seguimiento lo antes posible.

### Sensibilidad:

La sensibilidad al calor, al frío y a la presión son normales. También puede experimentar dolor en las encías durante unos días. Simplemente enjuague tres veces al día con agua salada tibia para reducir el dolor y la hinchazón.

Una cucharadita de sal en una taza de agua tibia, enjuague-haga gárgaras-escupa.

Si la molestia persiste, también puede usar medicamentos de venta libre según las indicaciones.

### Cuidado en Casa:

Evite comer alimentos pegajosos (chicle, caramelo blando, caramelo) y alimentos duros para ayudar a mantener su temporal en su lugar. Mastique solo en el lado opuesto de la boca.

Cepille sus dientes con normalidad a partir de la noche de su procedimiento.

**Use el hilo dental con mucho cuidado:** inserte y retire el hilo dental por el lado de su corona/puente temporal para evitar que la corona temporal se suelte.

Si está experimentando síntomas no mencionados anteriormente, o dolor persistente que no se puede controlar con medicamentos de venta libre, llame a nuestra oficina al (903) 482-6339 inmediatamente.