



Harvest Dental Van Alstyne
217 E Jefferson St, Van Alstyne,
TX 75495
(903) 482-6339
www.harvestdentaltexas.com/

POST-OPERATORIO DE CORONA | DOB:

Las coronas suelen requerir un par de citas para completarse. Los dientes se preparan durante la primera cita mientras se colocan coronas o puentes temporales para proteger sus dientes. Estas restauraciones temporales serán solo eso, una tapa protectora de plástico para cubrir la "preparación" mientras se fabrica su restauración **personalizada**.

Anestesia:

Es normal que sienta adormecimiento en los labios, dientes y lengua durante varias horas después de haber aplicado anestesia. Se sugiere no masticar hasta que el adormecimiento haya desaparecido por completo.

Coronas Temporales:

Hay ocasiones en las que las coronas temporales se caen. Por favor, llámenos cuando esto suceda y guarde la corona temporal para que podamos volver a cementarla. Tenga en cuenta que el ajuste adecuado de su restauración final depende de que su temporal permanezca en su sitio hasta la cementación final.

Si su temporal se cae, puede intentar colocar la corona suavemente en su lugar y ver si permanece segura. Si es así, continúe con su cuidado post-operatorio según las indicaciones y contáctenos si se vuelve a aflojar. Se puede colocar una pequeña cantidad de vaselina dentro de la temporal antes de intentar volver a colocarla para agregar una "succión" adicional que la fije en su posición.

Si la temporal no vuelve a deslizarse en su lugar correctamente, llame a nuestra oficina para programar una cita de seguimiento lo antes posible.

Sensibilidad:

La sensibilidad al calor, al frío y a la presión son normales. También puede experimentar dolor en las encías durante unos días. Simplemente enjuáguese tres veces al día con agua tibia con sal para reducir el dolor y la hinchazón.

Una cucharadita de sal en una taza de agua tibia, enjuagar-hacer gárgaras-escupir.

Si la molestia persiste, también puede usar medicamentos de venta libre según las indicaciones.

Cuidado en Casa:

Evite comer alimentos pegajosos (chicle, toffee, caramelo) y alimentos duros para ayudar a mantener su temporal en su lugar. Mastique solo en el lado opuesto de su boca.

Cepille sus dientes con normalidad a partir de la noche de su procedimiento.

Use hilo dental con mucho cuidado: inserte y retire el hilo dental por el lado de su corona temporal para evitar que la corona temporal se suelte.

Si experimenta síntomas no mencionados anteriormente, o dolor persistente que no se puede controlar con medicamentos de venta libre, llame a nuestra oficina al (903) 482-6339 de inmediato.