



Harvest Dental Van Alstyne
217 E Jefferson St, Van Alstyne, TX 75495
(903) 482-6339
www.harvestdentaltexas.com/

TERAPIA POSTOPERATORIA DE CONDUCTO RADICULAR | DOB:

El tratamiento de su diente NO está completo. El doctor ha colocado un empaste temporal medicado dentro de su diente para ayudar con el proceso de curación. Es esencial que regrese a nuestra oficina para recibir tratamiento adicional. **NO** coma nada durante las primeras dos horas después del procedimiento, ya que este es el tiempo que tarda el empaste temporal en endurecerse. Durante el resto del día, coma solo alimentos semisólidos. Es aconsejable masticar en el lado opuesto hasta que se complete el tratamiento. Bajo **NINGUNA** circunstancia debe masticar nada duro, goma de mascar, dulces o cualquier cosa pegajosa en el diente, incluso si no estaba experimentando ninguna molestia antes del tratamiento. **Esto puede provocar una fractura de su diente.** Seguir estas instrucciones es su responsabilidad y si su diente se fractura, es su responsabilidad y usted será responsable de los costos del tratamiento brindado.

Su tratamiento de conducto radicular ya está completo y tiene un empaste temporal. El o los conductos han sido sellados y ahora la naturaleza debe tener tiempo para reparar el daño que produjo el irritante original. No mastique con el diente hasta que se lo hayan restaurado. Aunque las raíces están selladas permanentemente, la superficie exterior está rellena con una restauración **temporal**, que se endurecerá dos horas después de su colocación y puede durar muchas semanas. Es aconsejable que consulte a su dentista habitual **lo antes posible** para restaurar el diente de forma permanente. Investigaciones actuales han demostrado que incluso los conductos radiculares recién sellados se contaminarán totalmente con bacterias si el empaste temporal falta durante más de tres semanas. Una restauración final (corona, incrustación, empaste) le dará al diente la protección necesaria.

Su tratamiento de conducto radicular ya está completo y tiene una reconstrucción de núcleo. El o los conductos han sido sellados y ahora la naturaleza debe tener tiempo para reparar el daño que produjo el irritante original. No mastique con el diente hasta que haya desaparecido toda la sensibilidad. Hemos colocado un empaste permanente en su diente. Aún necesita ver a su dentista para una posible corona nueva, y debe regresar para chequeos regulares.

Anestesia Local

La anestesia utilizada durante su procedimiento desaparecerá en unas pocas horas. Puede experimentar sensibilidad, hinchazón leve o hematomas en el sitio de la inyección. En raras ocasiones, puede ocurrir entumecimiento prolongado. Comuníquese con nuestra oficina si el entumecimiento no desaparece dentro de las 48 horas posteriores a su procedimiento.

Manejo del Dolor

Es normal que experimente cierto grado de molestia durante unos días. Esta sensibilidad es normal y no es motivo de alarma.

La molestia se puede aliviar tomando Aleve, ibuprofeno (Advil), aspirina o acetaminofeno (Tylenol) según las indicaciones.

600 mg de Ibuprofeno junto con 500 mg de Tylenol cada 6 horas durante 2 días según sea necesario. Los enjuagues de agua salada tibia (1/2 cucharadita de sal en 8 onzas de agua) también pueden ayudar. Si experimenta molestias que no se pueden controlar con los medicamentos anteriores o si se desarrolla hinchazón, comuníquese con nuestra oficina, estamos aquí para ayudar y estaremos encantados de hacerlo. Llame a nuestra oficina al (903) 482-6339 si tiene alguna pregunta o dificultad. Si es fuera del horario de atención, siga las indicaciones para conectarse con nuestro servicio de contestador. Si cree que sus síntomas justifican un médico y no puede comunicarse con el Dr. Aaron Horsley-Teny, vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.